

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor blockers in clinical practice

1. Een angioplastiek in hoogrisico-patiënten met een acuut coronair syndroom zonder blijvende ST-segment elevatie dient snel te geschieden. (Dit proefschrift)
2. Bij patiënten met een acuut coronair syndroom zonder blijvende ST-segment elevatie met een laag risico voor mortaliteit of infarct, dient angioplastiek te worden uit- of afgesteld. (Dit proefschrift)
3. Als bij de behandeling van een patiënt met een hartinfarct thrombolyse niet mag falen, dient bij voorbaat voor een alternatieve behandeling gekozen te worden. (Dit proefschrift)
4. IIb or not IIb should no longer be the question. (Auteur onbekend)
5. Het is onduidelijk wat de meerwaarde is van de veel te lange naam van de ziekte-beelden "hoog- en laagrisico acuut coronair syndroom zonder blijvende ST-segment stijging", boven de oudere terminologie: "dreigend infarct" en "onstabiele angina pectoris".
6. Een kwalitatief goede (ELISA) D-dimeer test is een waardevolle test om een long-embolie uit te sluiten. (*Guidelines on diagnosis and management of acute pulmonary embolism*. Task Force on Pulmonary Embolism, European Society of Cardiology 2000)
7. In de gezondheidszorg is het niet ongebruikelijk vanwege geldgebrek een dure noodoplossing te kiezen.
8. De activiteit van een jonge tweeling overdag is omgekeerd evenredig met de activiteit van de ouders 's avonds.
9. Het is een misvatting dat "evidence based medicine" wordt bedreven als bij medische beslissingen een studie-acronym wordt genoemd.
10. Artikelen schrijven is een middel en geen doel, voor de meeste doelen niet eens een efficiënt middel.
11. There are ill discoverers who think that there is no land, when they can see nothing but sea. (Sir Francis Bacon)
12. Het is onwaarschijnlijk dat het 12-leads elektrocardiogram, nog steeds de optimale weergave biedt voor de detectie en lokalisatie van ischemie.