

Stellingen

1. Het gebruik van mefloquine kan neuropsychiatrische klachten veroorzaken.
(dit proefschrift)
2. Vrouwen ondervinden frequenter neuropsychiatrische klachten tijdens het gebruik van mefloquine dan mannen.
(dit proefschrift)
3. Een lage body mass index vormt een belangrijke risicofactor voor neuropsychiatrische klachten tijdens het gebruik van mefloquine.
(dit proefschrift)
4. Serumspiegels van mefloquine zijn geassocieerd met het optreden van neuropsychiatrische klachten.
(dit proefschrift)
5. Normaal is het gemiddelde van alle afwijkingen.
6. Eén van de belangrijkste factoren in het onderzoek naar bijwerkingen van geneesmiddelen is (op) tijd (zijn).
7. Als er geen alternatief is, dan is er geen probleem.
(James Burnham)
8. Dat het grote aantal gemelde neuropsychiatrische bijwerkingen in Nederland niet heeft geleid tot nader etiologisch onderzoek onderstreept de belangrijke vangnetfunctie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
9. Een mogelijke bijwerking van de privacy-wetgeving is dat de uitvoering van valide post-marketing surveillance wordt bemoeilijkt.
10. Observationeel onderzoek naar bijwerkingen van geneesmiddelen wordt gehinderd door mediagekte en het veelvuldig gebruik van het internet.
11. De Amerikaanse presidentsverkiezingen suggereren dat er een positief verband is tussen rijkdom en analfabetisme.

Stellingen behorende bij het proefschrift "Neuropsychiatric effects of antimalarial drugs" van M.M. van Riemsdijk

Rotterdam, 31 januari 2001