

# Stellingen

---

- 1) In-stent neointimale hyperplasie na radioactieve stent implantatie wordt op een dosis afhankelijke manier geïnhibeerd. (*dit proefschrift*).
- 2) Edge restenose treedt vaker proximaal dan distaal van de stent op. (*dit proefschrift*).
- 3) Door het implanteren van Cold Ends stents verplaatst de edge restenose van buiten de stent naar in de stent. (*dit proefschrift*).
- 4) Radioactieve dosisverval is belangrijker dan ballon trauma als oorzaak van edge restenose. (*dit proefschrift*).
- 5) “Black holes” bestaan voornamelijk uit proteoglycanen met een opmerkelijk gebrek aan collageen weefsel. (*dit proefschrift*).
- 6) Radioactieve stents voorkomen niet, maar vertragen slechts restenose. (*dit proefschrift*).
- 7) Klimaatconferenties over het broeikaseffect lijken niet zinvol als het ’s zomer sneeuwt in Argentinië.
- 8) Rekening rijden bestaat al sinds de introductie van “het kwartje van Kok”.
- 9) De snelheid van de huidige computers wordt niet door de snelheid van de processor bepaald, maar door de snelheid van het geheugen.
- 10) Patiënten klagen meer over de wachttijd op de polikliniek, dan over de rij in de Albert Heijn.
- 11) Dat mensen van aandacht houden, blijkt uit de snelle verspreiding van het “I love you”-virus.

Stellingen behorend bij het proefschrift “Clinical evaluation of radioactive stents”  
A.J. Wardeh

Rotterdam, 19 september 2001