

Stellingen

I

De lamina perpendicularis levert een passieve bijdrage aan de sagittale groei van het neustussenschot.

II

Het verloop van fractuurlijnen in het neustussenschot is vaak voorspelbaar.

III

Een posterieure chondrotomie dient bij jonge kinderen vermeden te worden.

IV

Resectie van het posterio-inferieure gedeelte van het vomer heeft geen invloed op de verdere uitgroei van de neus.

V

Bij unilaterale lip, -kaak en verhemeltespleten bestaat de neusbodem aan de niet-spleetzijde voor een deel uit het vomer.

VI

"Communication disorders" verdienen in Nederland meer aandacht.

VII

Echelonnering in de specialistische zorg maakt een verkorting van de opleiding tot medisch specialist mogelijk voor velen en vereist een verlenging voor enkelen.

VIII

In het belang van de volksgezondheid dienen speciale voorzieningen getroffen te worden voor vrouwen, die het moederschap en een opleiding tot medisch specialist willen combineren.

IX

De behandeling van strottenhoofdtkanker is maatwerk geworden.

X

Arts en patiënt moeten partners worden.

XI

Het zogenaamde jeugdgevoel is een ouderdomsverschijnsel.

XII

Het woord "voor" bij de opdracht vooraf aan het proefschrift dient in vele gevallen gevolgd te worden door "mijzelf", aangezien menig promotie-onderzoek ten koste gaat van het gezin.

Stellingen behorende bij het proefschrift

Postnatal Development of the Human Nasal Septum and its Related Structures

door J. van Loosen, Rotterdam