

Stellingen behorend bij het proefschrift

Risk reduction by HPV-testing in women with premalignant cervical lesions

1. Vrouwen met een persisterende Pap 2/3a1 zonder hrHPV hebben géén voordeel bij verwijzing naar de gynaecoloog.
dit proefschrift
2. Het verrichten van een hrHPV test bij vrouwen met een persisterende Pap 2/3a1 leidt tot besparing van gezondheidskosten.
dit proefschrift
3. Kolposcopisch onderzoek is alleen geïndiceerd na behandeling van CIN wanneer naast een afwijkend uitstrijkje ook hrHPV is aangetoond.
dit proefschrift
4. Het aanbieden van een zelf-test op hrHPV motiveert vrouwen die niet reageerden op de reguliere oproep van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker alsnog tot deelname.
dit proefschrift
5. De meest ingrijpende verandering in de immuun respons op een HPV infectie vindt plaats tijdens de ontwikkeling van CIN 2 naar CIN 3:
van *tumor-inhibiting* naar *tumor-promoting*.
dit proefschrift
6. Bij veilige seks voor alletwee hoort ook bewustwording van HPV.
7. Grotere aandacht voor de eigen gezondheid heeft geleid tot een toename van thuis-testen, maar niet tot afname van ongerustheid.
8. Weerstand tegen vaccinatie verlaagt de weerstand tegen infectie.
9. Bais ≠ bias
Lancet 2000;356:70
10. Blij je weer te zien, maar ik heb niets meer te zeggen.
Bløf, Helder 1997
11. Luctor et Emergo