

Stellingen

Diagnostics in low back pain

1. Patiënten met lage rugpijn die worden verwezen door hun huisarts voor een MRI hebben vaak ernstige en/of langdurige rugklachten (dit proefschrift)
2. De uitslag van een lumbale MRI scan aangevraagd door de huisarts heeft geen toegevoegde prognostische waarde ten opzichte van informatie uit de anamnese (dit proefschrift)
3. Patiënten met positieve overtuigingen over hun rugpijn hebben een grotere kans op herstel (dit proefschrift)
4. Lumbale discusdegeneratie is gerelateerd aan het hebben van rugpijn; deze relatie is sterker wanneer meerdere niveaus zijn aangedaan (dit proefschrift)
5. Ochtendstijfheid van de rug kan een aanwijzing zijn voor lumbale discusdegeneratie (dit proefschrift)
6. Een diagnose kan van waarde zijn, zelfs zonder de beschikbaarheid van een effectieve behandeling, omdat het een logische route kan bieden voor de ontwikkeling en het testen van toekomstige interventies – Hancock et al. 2011
7. Het vervangen van een gewricht door een prothese resulteert lang niet altijd in een gelukkige patiënt – Beswick et al. 2012
8. Educatie bij specifieke rugpijn door de huisarts zelf zorgt voor een betere geruststelling dan wanneer deze gegeven wordt door een andere zorgverlener uit de eerste lijn zoals een doktersassistente of fysiotherapeut – Traeger et al. 2015
9. Artsen zullen zich moeten instellen op patiënten met zelf gegenereerde gezondheidsinformatie; zij krijgen een belangrijke rol bij het geven van betekenis aan data – Hengst et al. 2014
10. E-learning met behulp van virtuele patiënten is een uitstekende manier om de ontwikkeling van het klinisch redeneren bij studenten te ondersteunen – Bateman et al. 2013
11. Een theorie is pas compleet als je hem zo helder hebt dat je hem aan de eerste de beste voorbijganger kunt uitleggen – David Hilbert 1900