

## Stellingen

1. Pro Re Nata en Fixed-dose behandeling van natte LMD elke 8 weken hebben vergelijkbare visus en anatomische uitkomsten ten opzichte van 4 of 6 wekelijks behandelen. (dit proefschrift)
2. Het behandelen van het slechtste oog in patiënten met natte LMD heeft een positief effect op de kwaliteit van leven. (dit proefschrift)
3. Ongeveer 40% van de natte LMD patiënten heeft na 1 jaar Fixed-Dose behandeling nog een actief CNV ongeacht de eerdere frequentie van behandelingen (dit proefschrift)
4. Phased resolved doppler OCT is een geschikte techniek om abnormale vaatstromingen en de locatie daarvan binnen de retina te beoordelen. (dit proefschrift)
5. Behandelgroepen zonder 4 wekelijkse loading phase behaalden in onze studie vergelijkbare visus en anatomische resultaten bij natte LMD patiënten. (dit proefschrift)
6. De implementatie van registratie studies in de dagelijkse praktijk, leidt tot andere resultaten dan het eerder onderzoek doet beloven.
7. Schaarste van geneesmiddelen leidt tot inzichten en adaptie die eerder onbespreekbaar waren.
8. Richtlijnen zijn ideaal voor veel voorkomende aandoeningen maar een potentieel struikelblok voor zeldzamere.
9. Iedereen wil graag het eindstation van therapie succes bereiken maar als je een station eerder uitstapt, is uitleg over de route daarheen net zo belangrijk.
10. Nieuwe behandelingen veranderen onze verwachtingen, de historische context bepaald onze waardering daarvan.
11. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned. – Siddhartha Gautama